

Nr. 304 din 25.06.2025

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 45 / 25.06 /2025

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare:
PADUCHELE DIN SAN JOSE (*Quadraspidiotus perniciosus*) **tr. I, gen.I.**

Aplicați tratamente chimice la toate speciile pomicele pentru combaterea acestui dăunător, fiind considerat unul din cei mai periculoși dușmani ai pomilor fructiferi.


Ramurile atacate de acest dăunător, se cunosc după petele circulare de culoare roșie-vișinie.

Ramurile încep să se usuce de la vârf.

Atacul pe fructe este foarte des întâlnit, sub formă de pete roșii - vișinii, circulare, larvele fiind frecvent localizate în zona caliciului și a pedunculului.

Larvele păduchelului din San Jose de la fiecare generație, (1 - 3 generații /an) după depunere, au o perioadă de 3 - 4 zile când migrează pe scoarța tulpinii, pe ramuri, lăstari, frunze și fructe, pînă își formează scutul protector, perioadă cînd sunt cel mai sensibile la efectul insecticidelor.

Pentru tratament vă recomandăm unul dintre următoarele produse:



Deltagri / FASTER Delta	Specii pomicele	Paduchele din San Jose	0,3 - 0,45 l/ha	TP - 7 zile
Juvinal 10 EC	Specii pomicele	Paduchele din San Jose	0,05 - 0,075 % (50-75 ml/hl apă)	TP - 3 zile
Mospilan 20 SG/Krima 20 SG	Specii pomicele	Paduchele din San Jose	0,375 - 0,450 kg/ha (0,025-0,03%)	TP - 14 zile
Poleci (Deca 2,5 EC)	Specii pomicele	Paduchele din San Jose	50-75 ml/hl apa (0,05-0,075 %)	TP - 3 zile




Prin acest tratament se va insista mult și asupra organelor lemnoase ale pomilor și a fructelor.

Apariția foarte eșalonată a dăunătorului, impune **repetarea tratamentului la 10 - 12 zile.**

Prin acest tratament sunt vizați și alți dăunători ai pomilor.

Contra bolilor foliare vă recomandăm să adăugați în soluție și un fungicid, după cum urmează:

**La măr și păr și alte semîntoase**

Varianta I: - un produs care combate rapănul și făinarea:

BELLIS - 0,8 kg/ha sau **DOMARK 10 EC** - 0,4 l/ha (0,027 %) sau **FONTELIS** - 0,75 l/ha sau **LUNA EXPERIENCE 400 SC** - 0,75 l/ha sau **MACCANI** - 2,5 kg/ha sau **MOLINA** - 0,4 l/ha sau **STROBY DF** - 0,2 kg/ha;

Varianta II: - un fungicid care combate rapanul: **BATALION 450 SC** (**GLADIUS 450 SC**) - 0,7-1,0 l/ha sau **CAPTAN 80 WDG** (**CAPTADIN**) - 0,15% (2,250 kg/ha) sau **INTEREST 25 EC** (**DIFENZONE 25 EC**) - 0,2 l/ha, la care se adaugă un fungicid pentru combaterea fainarii: **CYFLAMID 5 EW** - 0,45 l/ha sau **KARATHANE M35CE** - 0,06% (0,9 l/ha) sau **KUMULUS DF** - 0,3% sau **TOPAS 100 EC** - 0,02 % (0,3 l/ha) sau **TEBUSTAR EW /MYSTIC TOP** - 0,05%.

La prun și alte sâmburoase (pătarea roșie, ciuruirii, monilioze etc). se adaugă: **VITRA 50 WP** (**CUPRIDIN**) - 1,5-2,0 kg/ha sau **LUNA EXPERIENCE 400 SC** - 0,5 l/ha (-0,05%) sau **FOLPAN 80 WDG** (**FLOVINE**) - 0,2 %.

În prealabil efectuați testul de compatibilitate. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înscrise pe ambalaj.

Pentru tratament se pot folosi și alte ppp, cu efect similar, omologate pentru a fi utilizate în România.

Tratamentele se efectuează la temperaturi sub 23° C (dimineața și seara).

Nu se tratează chimic pomii a căror fructe sunt în faza de pârgă -coacere, iar unde se tratează în mod accidental legume, etc., se respectă **timpul de pauză** până la consum în funcție de rețanența ppp. utilizat.

La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile și dozele recomandate și se vor citi cu atenție toate instrucțiunile înscrise pe ambalaj.

ATENȚIE: nu se vor utiliza pomii a căror fructe sunt în pârghă sau coapte :

Volumul mediu de soluție (l/ha) aplicat cu utilaje terestre în pomicultură este la măr, cireș, vișin, nuc 1500 l/ha iar la păr, gutui, prun, cais, piersic, nectarin, arbuști fructiferi, căpșuni, pepiniere pomicole 1000 l/ha.

Folositi pentru tratamentele dintr-un sezon produse din grupe chimice diferite (sau cu mod de acțiune diferit) pentru a evita apariția formelor de rezistență la un anumit produs.

Alte recomandari: Luati masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectati cu strictețe normele de lucru cu ppp, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al MAA, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/ TB/ 1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.

Respectati prevederile Ordinului MADR, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectati obligațiile ce va revin conform Ordinului MADR, Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) nr. 1107/2009; H.G nr. 1559/2012; O.G nr. 4/1995; OG nr. 41/2007; OM 352/2015. Respectarea cerințelor SMR 7 – Fermierii care prin activitatea lor, depozitează, manipulează și utilizează ppp au următoarele obligații: Sa utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate în Comisia Națională de Omologare a ppp, care se regăsesc în baza de date PEST EXPERT. Referințe: <https://www.madr.ro/ro/fitosanitar> Sa utilizeze ppp numai în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare după eticheta produsului; Sa pastreze pe o perioadă de 3 ani documentele de evidență contabilă a ppp depozitate și utilizate în exploatare, precum și Registrul de evidență a tratamentelor fitosanitare cu ppp. 1

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza și avertizare Nume și prenume fermier/ soc. comercială... Domiciliu fermier/ sediul social al societății (Comuna, județul) Ferma (nume/număr, adresa) ...

REGISTRU de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.

Data efectuării tratament	Culturașilunde este utilizat	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele persoanei responsabile pentru efectuarea tratamentului. Semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr și data doc prin care s-a dat în consum populației
			Agenti de dăunarecombăuți Boli / dăunători/buruieni	Denumire produs de protecție a plantelor folosit	Doza :		Supra-fața (ha)			
					Omologată	Folosită		Cantități utilizate (kg/litri)		

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)) Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății. Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regu (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i), (1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei). **IN ATENȚIA FERMIERILOR !!!** Respectarea condițiilor de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă, conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor, elaborat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA.

Pentru mai multe detalii accesați: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Coordonator,
Dr ing. Cristea Olga



Intocmit,
Ing. Bologa Vasile

